

DESCRIPCIÓN

- COCHIBIOL es un insecticida de contacto derivado de aceites vegetales, aplicable en cultivos como Banano, Mango y Brócoli.
- Su fórmula a base de tenso-activos, dispersantes, adherentes y emulsificantes controla plagas como escama, cochinilla, pulgón, mosca blanca y otros insectos como ácaros y thrips.

DOSIS

Cultivo	Problema		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	
Banano	Mosca blanca	Aleurotrachelus sp.	1% de concentración. 2 litros en 200 litros de agua. Intervalos máximos de 12 días
	Cochinilla	Dysmicoccus sp.	
Mango	Escama blanca	Aulacaspis tubercularis	
	Cochinilla	Dysmicoccus sp.	
Brócoli	Pulgón	Brevicoryne brassicae	0.5 al 1% de concentración. Intervalos de 7 días.

Las dosis y los programas de aplicación varían de acuerdo con el cultivo, etapa, el estado de la plaga y la severidad de la infestación. Para mayor información, consulte con nuestro departamento técnico.

BENEFICIOS

- Es de origen vegetal.
- Acción inmediata.
- Biodegradable.
- Certificación orgánica BCS de Alemania.



BONDADES

- No contamina el medio ambiente.
- No es tóxico.
- No causa efectos al aplicador.



INSTRUCCIONES DE USO

- Diluir la dosis recomendada de COCHIBIOL en 5 litros de agua. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Verter la mezcla en un tanque y completar el volumen de agua a utilizar. Continuar la agitación.
- Agitar la solución antes de llenar el equipo de aplicación.
- Aplicar en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, siempre que haya baja intensidad de luz.
- Cochibiol debe ser aplicado el mismo día que se lo prepara. No guardar producto preparado.
- Asegurar que los equipos estén limpios.
- Calibrar los equipos antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto.
 Mantener el producto alejado del alcance de los niños y animales domésticos, cerrado en su envase original.
 Conservar en un lugar fresco y seco.
 En condiciones normales de uso y en las dosis recomendadas, no presenta riesgos a la persona que manipula el producto, sin embargo debe ser manejado con cuidado.
 En caso de contacto con los ojos, lavar el área con abundante agua.
 En caso de ingestión, acudir al médico llevando la etiqueta del producto.
 Realizar triple lavado y destruir el envase.

PRESENTACIONES

Litro Caneca (20 Litros)
 Galón (4 Litros) Tanque (140 - 200 Litros)

MODO DE ACCIÓN

- COCHIBIOL derrite la capa cerosa de la cochinilla (*Dysmicoccus brevipes*) ocasionando asfixia y muerte inmediata.
- Por su modo de acción no causa resistencia.
- COCHIBIOL puede actuar potenciando otros productos químicos, por lo que se sugiere realizar pruebas de compatibilidad previo las aplicaciones.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- La aplicación de COCHIBIOL debe ser dirigida a la plaga, procurando realizar una buena cobertura. En banano, aplicar COCHIBIOL al pseudo-tallo en el momento del deschante hasta una altura de 1.80 m. y a la chanta saliente. En post-cosecha, al convoy dejando actuar el producto al menos 10 minutos.
- En mango y brócoli, aplicar COCHIBIOL al follaje procurando realizar una buena cobertura.
- Frecuencia:
Las repeticiones se las debe realizar de acuerdo al grado de infestación o hasta romper el ciclo biológico de la plaga.
- Equipos:
Bomba de mochila manual, con boquillas 80-03 / 80-04, o cono graduable.
Bomba de mochila a motor con salida 4-5.

PRODUCIDO POR:



DISTRIBUIDO POR:

Bioteedor
 Biotecnología para el agricultor

Telefax: 593 4 220 0653 - 593 4 220 0635



reg. 182 Fo.I.D./NA